

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VÂN
 Số: 25/CV-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn phòng trừ ốc Bươu vàng
 gây hại trên cây lúa vụ Đông xuân năm
 2020 - 2021

Cẩm Vân, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Ông.....Trưởng thôn.....

Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Song qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, ốc bươu vàng đang phát triển và gây hại với mật độ 2 - 3 con/m², cục bộ 6 - 8 con/m². Ốc bươu vàng có thể sống cả dưới nước và trên cạn nhưng chủ yếu là dưới nước. Chúng có thể sống nhiều tháng trong điều kiện khô hạn bằng cách đóng nắp và vùi sâu trong đất, nên giai đoạn này được gọi là khoảng thời gian ngủ của ốc. Hiện tại Ốc bươu vàng phát sinh chủ yếu ở các mương dẫn nước, khi tiến hành dẫn nước vào ruộng ốc sẽ di chuyển vào và gây hại. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt UBND xã hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng như sau:

*** Biện pháp canh tác và thủ công thủ công:**

- Tổ chức bắt, tiêu diệt ốc trên mương dẫn nước, trước khi đưa nước vào ruộng.
- Đặt lưới, phen tre chặn mương nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch.
- Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nên bắt ốc sớm và liên tục từ lúc cấy đến 2, 3 tuần sau.
- Đánh rãnh thoát nước (25 x 5 cm) cách nhau 10 - 15m, sử dụng thức ăn như lá khoai, rau muống... dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom bằng tay.
- Cắm các cọc tre, sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng.
- Dùng vôi để trừ ốc bươu vàng và giúp cải tạo đất, liều dùng 25 kg/sào 500m². Có thể xử lý vôi kết hợp với lân vào giai đoạn bón lót.
- Bón phân thúc sớm đủ để lúa đẻ khỏe hạn chế sự cắn phá của ốc.

*** Biện pháp hóa học:**

- Khi mật độ ốc bươu vàng là 3 con/m², nên khuyến cáo bà con nhân dân sử dụng một số loại thuốc như: NP Snailicide 7000 WP, DIOTO 250EC, Mối ốc 6GR,

Awar 700WP, Osbuvang 80 Wp.. hoặc loại thuốc có hoạt chất Niclosamide để phun trừ.

- Nồng độ, liều lượng, cách phun : Theo hướng dẫn in trên bao bì.

Lưu ý:

+ Khi phun nên để mực nước khoảng 2 - 3 cm là vừa. Sau phun tiếp tục giữ nước 1 - 2 ngày để diệt hết ốc còn sót lại.

+ Nên phun thuốc lúc chiều mát hay sáng sớm. Tốt nhất vào lúc chiều mát vì ốc thường nổi lên và cắn phá mầm lúa vào lúc chiều và tối.

+ Phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

Nhằm đạt chỉ tiêu sản lượng lương thực đề ra của UBND xã trong vụ Chiêm xuân 2020 – 2021, UBND xã hướng dẫn một số biện pháp phòng, trừ ốc bươu vàng gây hại trên cây lúa như trên. Đề nghị các trưởng thôn tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- 8 thôn
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Vĩnh