

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57 /CV-UBND

Cẩm Vân, ngày 26 tháng 03 năm 2021

V/v phòng trừ bệnh đạo ôn và
một số sâu bệnh hại trên Lúa vụ
Chiêm Xuân năm 2021

Kính gửi:.....Trưởng thôn.....
Theo công văn số 06/TTDV-TT&BVTV ngày 23 tháng 3 năm 2021 của
TTDV Nông nghiệp huyện Cẩm Thủy v/v phòng trừ bệnh đạo ôn và một số sâu bệnh
hại trên Lúa vụ Chiêm Xuân 2021.

Hiện nay, lúa Chiêm Xuân đang ở giai đoạn kết thúc đẻ nhánh đến đứng cái
làm đồng. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là nắng ẩm liên tục trong thời kỳ đầu
mới cấy nên lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 3 đến nay,
thời tiết mưa ẩm, trời âm u kéo dài tạo điều kiện rất thuận cho sâu bệnh hại lúa, đặc
biệt là bệnh đạo ôn phát sinh, gây hại và đang có chiều hướng gia tăng về quy mô và
mức độ.

Qua kiểm tra của Trung tâm DVNN huyện đến nay bệnh đạo ôn trên lá phát
sinh rải rác trên các giống nhiễm ở hầu hết các trà lúa, bệnh phổ biến từ cấp 1 đến
cấp 3, tỷ lệ 5-15%, cao trên 20% và cục bộ bị lụi chòm, ở hầu hết các xã.

Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ lúa 1 phát sinh rải rác mức độ thấp. Sâu phổ biến
tuổi 5, mật độ 2 - 4 con/m², và đang tích lũy số lượng cho lứa 2 phát sinh vào cuối
tháng 3 đầu tháng 4/2021. Chuột; ốc bươu vàng; ... phát sinh và gây hại mạnh.

Qua thực tế đi thăm đồng của Ban Nông nghiệp xã trên diện tích Lúa trong địa
bàn xã, hiện nay cũng có một số diện tích nhỏ ở các thôn cũng đã xuất hiện sâu và
bệnh hại, vậy để bảo vệ sản xuất lúa Chiêm Xuân, UBND xã đề nghị các trưởng thôn
quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

- Theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ và các loại
sâu bệnh hại khác, khoanh vùng diện tích nhiễm cao.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tự kiểm tra
ruộng của mình để phát hiện và phòng trừ kịp thời.

- Thông báo cho bà con tuyệt đối không bón đạm lai rai, khi phát hiện vết
bệnh đạo ôn, khuyến cáo cho nông dân ngừng bón đạm, không phun các loại phân
bón qua lá có chứa đạm, duy trì mực nước mặt ruộng 3-5 cm tạo điều kiện thuận lợi
cho lúa đẻ nhánh, phát huy hiệu lực của thuốc trừ bệnh. Đồng thời nông dân khi phát

hiện trên ruộng có vết bệnh tiến hành phun thuốc ngay bằng các loại thuốc có nhóm hoạt chất: **(1). Hoạt chất Tricyclazole:** *Beam 75 WP, Trizole 75 WP,....* **(2). Hoạt chất Isoprothiolane:** *Bump 650 WP, Ninja 35 EC,...* **(3). Hoạt chất Fenoxanil:** *Taiyou 20SC, Sako 25 WP,...* Ngoài ra, có thể sử dụng một số hoạt chất khác với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đặc trị bệnh đạo ôn lá. Nông dân cần phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện, trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày điều tra nếu thấy còn nhiều vết bệnh thì tiến hành xử lý thuốc lần 2.

Ngoài ra, cần tập trung theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (vào cuối tháng 3 đầu tháng 4); phòng trừ đồng bộ ốc brou vàng và chuột hại trên lúa.

Trước tình hình hiện nay công tác phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh là điều kiện quyết định đến năng suất cây trồng. UBND xã, đề nghị các trưởng thôn quan tâm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Duy Vĩnh